


带状疱疹ワクチンのお知らせ

不活化ワクチン（シングリックス）	22000円	を2回接種	
ただし 加古川市民、播磨町民、	稲美町民は1回10000円		の助成あり
明石市民は	1回4000円		の助成あり
生ワクチン	7000円	を1回接種	
ただし 加古川市民、播磨町民、	稲美町民は1回4000円		の助成あり
明石市民は	1回4000円		の助成あり

带状疱疹ワクチンのお知らせ

販売名	乾燥弱毒性水痘ワクチン「ビケン」	シングリックス 筋注用
製造販売業者等	阪大微研-田辺三菱・武田	グラクソ・スミスクライン
ワクチンの種類	生ワクチン	不活化ワクチン（組換えサブユニットワクチン）
包装 製剤写真	 <p>1バイアル 7,000円 溶剤（日本薬局方注射水）0.7mL付</p>	 <p>1バイアル 22,000円 専用溶解溶液 0.5mL付</p>
効能・効果	<ul style="list-style-type: none"> ●水痘の予防 ●50歳以上の者に対する带状疱疹の予防 	带状疱疹の予防
1回接種量・接種部位	0.5mL・皮下注 ※溶剤0.7mLで溶解する	0.5mL・筋肉内 ※溶剤0.5mLで溶解する
接種回数	1回/50歳以上	2か月間隔で2回/50歳以上
持続効果	5年間*	9年間
予防効果	60歳以上：51.3%*	50歳以上での有効性：97.2%、70歳以上での有効性：89.8%
带状疱疹神経痛の減少率	66.5%*	50歳以上：100%、70歳以上：85.5%
禁忌内容 (接種不相当者)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 明らかな発熱を呈している者 2. 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者 3. 本剤の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者 4. 妊娠していることが明らかな者 5. 上記に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者 6. 明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する者及び免疫抑制をきたす治療を受けている者 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 明らかな発熱を呈している者 2. 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者 3. 本剤の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者 4. 上記に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者
一般的な 接種スケジュール	すでに生ワクチン（注射剤）の接種を受けている場合は 27日以上間隔を空けてこのワクチンを接種できます	<ul style="list-style-type: none"> ● 2回目の接種は、1回目の接種から2か月後 ● 1回目の接種から2か月を超えた場合であっても、6か月後までに2回目の接種を行う  <p>接種回数は2回</p> <p>標準接種間隔：2か月</p> <p>2か月を超えた場合であっても、6か月後までに2回目の接種を行う</p> <p>0 2 6(か月)</p>